

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

INSEE : 313244253-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P. N° 524 AD

DLP-7-11-80598937

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

ABONNEMENT ANNUEL

70,00 FRANCS

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 670246 X

5 NOVEMBRE 1980 - BULLETIN TECHNIQUE N° 28

Aux Mairies abonnées aux bulletins
techniques de la station "AQUITAINE"

Nous demandons à toutes les mairies intéressées par l'abonnement en 1981 aux bulletins techniques édités par la Station d'Avertissements Agricoles "Aquitaine" de bien vouloir nous adresser avant le 15 FEVRIER 1981, un bon de commande pour le nombre d'exemplaires désirés.

Dès réception de ce bon de commande nous leur adresserons un mémoire en double exemplaire pour le montant de leur abonnement.

Pour les réabonnements personnels aux avertissements agricoles, attendre la réception du bulletin spécial fixant les modalités qui sera adressé fin décembre.

ARBORICULTURE

FEU BACTERIEN

Nous attirons l'attention des arboriculteurs sur le danger de propagation du Feu bactérien par les oiseaux, notamment en hiver, par les grives et les étourneaux venant dans les vergers consommer les fruits restés sur les arbres.

Il est nécessaire, dès la fin de la chute des feuilles, de passer dans tous les vergers de pommiers, poiriers et cognassiers et de faire tomber tous les fruits restant sur les arbres.

Ces fruits peuvent sans inconvénient rester sur le sol.

Cette élémentaire précaution assurera une bonne part de la protection des vergers.

Opérations de taille

Nous rappelons l'importance de la désinfection des outils de taille devant servir dans tous les vergers de poiriers, pommiers et cognassiers. Ces outils doivent être désinfectés soigneusement :

- avant le début des travaux,
- à la fin de la taille de chaque parcelle,
- à l'extrémité de chaque rang, lors de la taille de poiriers Passe-Crassane.

P384.../...

Cette désinfection peut se faire par un bref trempage dans un récipient contenant de l'alcool à brûler.

Nous rappelons qu'un traitement cuprique à 500 grammes de cuivre métal par hectolitre doit être envisagé à environ deux tiers de la chute des feuilles dans tous les vergers de poiriers de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées Atlantiques, (voir bulletin n° 27 du 8 octobre 1960).

Ce traitement peut être appliqué sur pommiers par mesure de précautions, en particulier pour les variétés attaquées par le chancre commun.

Des cas de phytotoxicité étant signalés lors d'applications à bas volume, il est recommandé de réduire à 250 g/hl la dose de cuivre mise en oeuvre dans ce type de pulvérisation.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE",

Imprimerie de la Station de Bordeaux.
Directeur-Gérant : J. THIAULT.

M. LARGE